



聯新國際醫療

壠新醫院

桃園國際機場醫療中心

LANDSEED HOSPITAL, TAIWAN TAOYUAN INT'L AIRPORT

國際預防接種簡介

疫苗種類	流行性腦脊髓膜炎	黃熱病
接種劑量	每劑 0.5ml	每劑 0.5ml
禁忌	嚴重急慢性疾病、發燒、2 歲以下。	嚴重急慢性疾病、發燒、1 歲以下、對蛋過敏及免疫缺損、懷孕。
接種對象。	赴流行性腦脊髓膜炎流行地區或國內民眾自費接種流行性腦脊髓膜炎疫苗之需求。	赴黃熱病流行地區或國內民眾自費接種黃熱病疫苗之需求。
接種時程	接種 1 劑	接種 1 劑
申請方式	1.民眾需備護照正(影)本。	1.民眾需備護照正(影)本。
效期	效期 4 年	終身
出發前	7-10 天	10 天
副作用	主要為接種部位紅、腫與疼痛	10%接種者第 5~10 天類感冒症狀，如頭痛、肌肉痛或輕微發燒

疫苗種類	狂犬病	A 型肝炎
接種劑量	每劑 0.5ml	1-18 歲 每劑 0.5ml >18 歲 每劑 1.0ml
禁忌	急性疾病、發燒、對 neomycin 過敏者	發燒，已知對A肝疫苗過敏者、一歲以下
接種對象。	<p>暴露後：於狂犬病疫區遭溫血動物咬傷，返國後需完成後續疫苗接種劑次之民眾。</p> <p>-----</p> <p>暴露前： 狂犬病毒實驗室工作人員或需滯留在國外狂犬病疫區地的旅客</p>	<p>1. 赴 A 型肝炎盛行的國家工作或旅遊者</p> <p>2. 40 歲以下青壯年無 A 型肝炎抗體比例高達 90%</p>



聯新國際醫療

壠新醫院

桃園國際機場醫療中心

LANDSEED HOSPITAL, TAIWAN TAOYUAN INT'L AIRPORT

接種時程	暴露後：第0、3、7、14、28 (或21)天各接種1 劑，共5 劑。 ----- 暴露前：第0、7、28(或21)天各接種1 劑，共3 劑。	接種 2 劑，兩劑疫苗須間隔6-12 月(至少出國前兩周接種第一劑)
申請方式	1.暴露後：民眾需檢具身分證明文件正本、入出境紀錄影本、原始接種紀錄正(影)本或於遭咬傷地區之相關就醫紀錄等足茲證明之文件(診斷證明書)。 ----- 暴露前：民眾需檢具申請書，經CDC 審核後轉介委外醫院。 2.若不屬補助範圍，民眾可自費疫苗施打	至桃園機場第一航廈醫療中心
效期	效期 5 年(高風險族群須定時追加)	20 年
出發前	28 天	14 天
副作用	局部反應外，少數人在 1-2 天內會頭痛、頭暈、噁心	注射局部紅腫或疼痛，少數會發燒



聯新國際醫療

壠新醫院

桃園國際機場醫療中心

LANDSEED HOSPITAL, TAIWAN TAOYUAN INT'L AIRPORT

疫苗種類	小兒麻痺	日本腦炎	麻疹、德國麻疹、腮腺炎
接種劑量	每劑 0.5ml	減毒活性疫苗：年齡等於或大於 12 個月者：皮下注射一劑 0.5 毫升之配製疫苗。	全年齡皮下注射 0.5ml
禁忌	嚴重急慢性疾病、發燒、對 Streptomycin 等成份過敏	急性疾病、發燒	對蛋過敏、發燒、懷孕，嚴重慢性病與免疫功能受損者
接種對象	赴小兒麻痺流行地區工作或長期留駐當地等。	於日本腦炎流行期至流行區旅行時間達一個月或以上者，國內民眾自費接種疫苗之需求。	此三種疾病仍遍布全世界，未證實完全除役之國家，接建議接種
接種時程	<ol style="list-style-type: none">1. 前往前述有感染風險國家的旅客，應確認已完成小兒麻痺基礎免疫，並可考慮追加接種 1 劑疫苗，未完成或接種史不明的旅客建議行前補接種 3 劑疫苗；預計於「流行國家」、「發病國家」停留 4 週以上的旅客，如距離最後 1 次接種已超過 1 年，建議再追加接種 1 劑疫苗，並將接種資料登載於國際預防接種證明書上。2. 在「流行國家」、「發病國家」停留 4 週以上的	<ol style="list-style-type: none">1. 活性減毒嵌合型疫苗：建議施打 1 劑	<ol style="list-style-type: none">1. 成人建議至少接種 1 劑，隔四周可施打第二劑2. 若至麻疹流行區：<ol style="list-style-type: none">(1) 6 個月以下嬰兒暫緩前往，6 個月至一歲可先行自費接種一劑，後續再按時程完成 2 劑公費疫苗。(2) 1-6 歲幼兒，未完成 MMR 疫苗接種者，應於接種 MMR 疫苗後兩周再出發。



聯新國際醫療

壠新醫院

桃園國際機場醫療中心

LANDSEED HOSPITAL, TAIWAN TAOYUAN INT'L AIRPORT

	<p>旅客，可能在出境時被要求出示預防接種證明書，部分國家也可能要求來自高風險國家的旅客出示接種證明書。</p> <p>3. 幼兒應至少打完 3 劑含小兒麻痺成份之疫苗，才能得到足夠保護力，接種期程請參考我國幼兒常規接種時程</p> <p>4. 建議未接種或接種史不明的成人，完成 3 劑補接種，前 2 劑間隔 4~8 週，第 3 劑與第 2 劑間隔 6~12 個月；如不及按照前述期程施打，可於第 1 劑接種後間隔至少 4 週接種第 2 劑，第 2 劑接種後間隔至少 4 週再接種第 3 劑</p>		
效期	最後 1 次接種已超過 1 年，建議再追加接種 1 劑疫苗	活性減毒疫苗:約五年	15 年
出發前	出發前 8 週	出發前 2 周	2 週
副作用		少數在 3-7 天後出現全身無力，肌痛，發燒，頭痛等症狀	約 5-10%在接種後 5-12 天會有咳嗽、鼻炎等症狀

一般成人疫苗簡介



聯新國際醫療

壠新醫院

桃園國際機場醫療中心

LANDSEED HOSPITAL, TAIWAN TAOYUAN INT'L AIRPORT

疫苗種類	B 型肝炎	子宮頸癌	肺炎鏈球菌-結合型疫苗
接種劑量	每劑 0.5ml	每劑0.5ml	每劑 0.5ml
禁忌	嚴重急慢性疾病、發燒、B 型肝炎帶原者	急性疾病、發燒，曾對子宮頸癌疫苗產生過敏反應、懷孕	對疫苗成分過敏者
接種對象。	依時程完成B型肝炎疫苗接種者，經檢驗為B型肝炎表面抗體陰性者	9-26 歲女性建議施打，超過 26 歲可以施打，但若有疫苗衍生問題，不適用藥害救濟	1. 19-64 歲之高風險族群可接種一劑， 2. 65 歲以上民眾皆建議接種一劑 3. 建議終身施打一劑
接種時程	高危險接觸者可補打一劑，一般成人目前無建議補打疫苗	建議於 6 個月內施打 3 劑。施打的時程是在首次劑量後第 2 個月及第 6 個月完成第二和第三劑。	若之前有接種過肺炎鏈球菌相關疫苗，需間隔一年之後再接種
效期	效期 15-20 年	截至目前為止，疫苗的研究僅長達 10 年，所以預估保護力至少可達到 10 年	10 年
副作用	注射部位痛、腫脹、癢及發紅、發燒、噁心、暈眩	注射部位痛、腫脹、癢及發紅、發燒、噁心、暈眩	注射局部不良反應、少數輕微發燒，躁動、頭暈